


# ANESTESIA GENERALE

## LISTA DEGLI EFFETTI SECONDARI POSSIBILI E DELLA LORO FREQUENZA

### Da molto frequenti a frequenti:

- **Nausea e vomito:** certi tipi di intervento o d'anestesia provocano più nausea e vomito di altri; nella maggior parte dei casi nausea e vomito possono essere trattati o passano spontaneamente, ma possono durare da qualche ora a qualche giorno.
- **Mal di gola:** l'inserimento di una sonda nella trachea o nello stomaco, in anestesia generale, può causare mal di gola. Questo inconveniente sparisce in qualche ora o qualche giorno, e può essere trattato con pastiglie contro il mal di gola.
- **Vertigini:** l'anestesia o la perdita di liquidi corporei possono diminuire la pressione arteriosa, indebolendo il paziente. Per limitare questo problema, si utilizzano trasfusioni o appositi farmaci.
- **Brividi:** possono essere dovuti al raffreddamento durante l'intervento, a certi tipi di farmaci o allo stress; per scaldare il paziente si usano delle coperte.
- **Mal di testa:** causa del mal di testa possono essere l'anestesia, l'intervento, la perdita di liquidi, lo stress.
- **Prurito:** il prurito è un effetto secondario di analgesici potenti (come ad esempio la morfina), ma può anche verificarsi a causa di una reazione allergica.
- **Dolori muscolari, articolari e mal di schiena:** durante l'operazione il paziente rimane immobile nella stessa posizione sul tavolo operatorio. Sebbene venga fatto tutto il possibile per favorirne il comfort, alcuni pazienti sentono qualche dolore dopo l'intervento.
- **Confusione e perdita di memoria:** si tratta di un problema comune nelle persone anziane che subiscono un'operazione in anestesia generale. Normalmente il fenomeno è temporaneo, e può durare anche qualche giorno o settimana.



### Poco frequenti:

- **Infezioni polmonari:** le infezioni polmonari sopravvengono soprattutto nei fumatori e possono provocare difficoltà respiratorie; per questo è necessario smettere di fumare prima di un intervento.
- **Problemi urinari:** dopo certi tipi di intervento gli uomini possono avere difficoltà a urinare e le donne soffrire di incontinenza passeggera. Questi problemi si risolvono spontaneamente, ma talvolta sarà necessario posizionare una sonda.
- **Depressione respiratoria:** alcuni farmaci possono causare un rallentamento del respiro e/o sonnolenza dopo l'intervento; è un fenomeno passeggero che, se necessario, viene trattato farmacologicamente.
- **Danni ai denti, alle labbra o alla lingua:** si possono verificare quando il paziente serra forte la mascella al momento del risveglio dall'anestesia generale, o se il medico anestesista ha avuto difficoltà a introdurre il tubo nella trachea.
- **Esacerbazione di una malattia precedente:** un'affezione precedente (una malattia al cuore o dei vasi sanguigni per esempio), che magari non era stata riconosciuta prima dell'intervento, si può aggravare o può comparire durante o dopo l'intervento.
- **Risveglio durante l'intervento:** il rischio che il paziente diventi cosciente durante l'intervento dipende dallo stato di salute generale, dal tipo di intervento e dalla tecnica d'anestesia.

### Rare e molto rare:

- **Reazione allergica ai farmaci:** l'eventuale reazione allergica viene diagnosticata e trattata molto rapidamente. In casi estremamente rari reazioni importanti possono portare al decesso anche pazienti giovani; per questo è importante che l'anestesista conosca eventuali allergie del paziente e della sua famiglia.
- **Decesso:** un decesso in seguito ad un'anestesia è molto raro, ed è quasi sempre conseguenza di una somma di complicazioni che sopraggiungono simultaneamente.